



Chardonneret élégant © C.Morvan

Bilan du comptage « Oiseaux des jardins »

Résultats des 30 et 31 janvier 2016 en Côtes-d'Armor


Violette Le Guern et Yann Février



Pour cette 8e édition du comptage "Oiseaux des Jardins", 831 sites ont été recensés en Côtes-d'Armor, totalisant 84 espèces et plus de 28 400 oiseaux observés. Cet hiver, le week-end du comptage a malheureusement été pluvieux et venté, ce qui à première vue pourrai avoir dissuadé nombre de compteurs habituels et sûrement de nombreux oiseaux à mettre le nez hors de leurs abris. Pourtant, malgré ces mauvaises conditions météo, un nombre plus important d'oiseaux et une plus grande diversité d'espèce ont été observés en comparaison de l'année précédente (28 249 oiseaux pour 74 espèces en 2015).

Participation par commune :

247 communes ont été concernées par le comptage en 2016, dont 5 pour la première fois : Berhet, Gurunhuel, Landébia, Plévin et Saint-Maudez. La commune de Saint-Brieuc voit le nombre de participant augmenter chaque année : 63 jardins y ont été recensés, soit un peu plus de 7% des participations totales. Viennent ensuite Lannion et Trégueux avec une vingtaine de participants chacune.




Nombre de retour par commune en 2016



Mésange bleue © J-P. Touaux

Fréquence et abondance




Podium des fréquences

Les trois espèces les plus abondantes sont : le Moineau domestique (un peu plus de 4 individus en moyenne par jardin), la Mésange bleue (un peu moins de 4), puis le Pinson des arbres (un peu plus de 3).




Podium des abondances



Classement des 20 espèces les plus fréquentes (à gauche) et les plus abondantes (à droite) dans les jardins des Côtes-d'Armor en 2016


Influence du nourrissage




Tous les oiseaux ne semblent pas réagir de la même manière à la présence d'un poste de nourrissage. Une relation directe avec l'utilisation de la mangeoire peut être établie : les espèces dont l'abondance augmente en présence d'un poste de nourrissage sont aussi celles qui y sont le plus fréquemment observées : Fringillidés (Pinsons, Verdiers...), Mésanges bleues et charbonnières. Soit globalement des espèces granivores. Les espèces peu ou pas influencées sont des espèces présentant un régime alimentaire plus

diversifié comme le Merle noir et le Rougegorge familier. Mettre de la nourriture à disposition favorise certaines espèces dont les effectifs peuvent alors tripler comme la Mésange bleue ou le Verdier d'Europe. Ce n'est donc pas un geste anodin, d'autant que le nourrissage a parfois des effets négatifs (changement de régime alimentaire, contamination parasitaire...). Pensez à n'approvisionner que par grand froid, stoppez le nourrissage début mars et nettoyez bien les mangeoires chaque année.

Certaines espèces semblent plus observées lorsqu'il n'y a pas de poste de nourrissage. Plus qu'une aversion pour la nourriture mise à disposition, c'est surtout la diversité d'oiseaux dans les jardins ou sites sans mangeoire et une attention des observateurs non focalisée autour des mangeoires qui peut expliquer cela.



Ville ou Campagne ?



Comparaison de l'abondance moyenne de 6 espèces communes en fonction du milieu (Campagne, Bourg ou Ville)

La majorité des espèces a été observée dans les trois types de milieux représentés. Pour beaucoup c'est à la campagne qu'elles sont le plus abondantes, on y note des effectifs supérieurs notamment pour des oiseaux liés au bocage tels que le Pinson des arbres ou la Mésange bleue. Mais les oiseaux trouvent aussi en ville des conditions favorables, avec des températures en moyenne plus douces et des sources de nourriture (mangeoires notamment).

Le Choucas des tours, par exemple, et le Moineau domestique sont plus observés lors de l'enquête en milieu urbanisé mais c'est surtout dans les bourgs que ces deux espèces sont le plus abondantes.

Enfin, beaucoup d'espèces ont été autant contactées en centre-ville qu'à la campagne. Considérées comme opportunistes, elles s'adaptent assez bien à des environnements très divers. On y retrouve le Merle noir, qui semblait déjà peu influencé par le nourrissage, ou encore l'Accenteur mouchet



Identification : la Mésange noire

Tous les ans, lors du comptage "Oiseaux des Jardins", la Mésange noire tient une bonne place en terme d'abondance. Pourtant cette espèce reste très localisée en Bretagne : elle est généralement observée au cœur de massifs forestiers, au sein de plantations âgées de Conifères. Toutefois il s'agit aussi d'une espèce dite irruptive, qui connaît des phénomènes d'abondance certaines années ; l'espèce peut alors être rencontrée en

hiver dans une plus grande diversité de milieu (parcs, jardins...etc). La Mésange noire reste peu commune dans nos jardins et peut facilement être confondue avec son omniprésente cousine : la Mésange charbonnière. Le nombre important d'observations lors du comptage dans des milieux où il est peu probable de la trouver laisse présager une confusion courante entre les deux espèces.



Mésange noire (↑) Mésange charbonnière (→) © Y. Février

Différentes par la taille (la Mésange noire a une taille semblable à celle de la Mésange bleue), les deux espèces arborent un plumage proche (calotte et bavette noires), toutefois la Mésange noire est bien plus terne que la charbonnière.

TROIS ELEMENTS POUR LA DISTINGUER A COUP

SUR :

De profil,

Elle n'a pas du tout de plumage jaune. Si vous apercevez une coloration jaune, c'est une charbonnière.

De face,

Elle ne possède pas la grande barre noire ventrale de la Mésange charbonnière.

De dos,

Une large tâche blanche recouvre en partie l'arrière de sa tête.

Comptage 2017

Le prochain comptage aura lieu, comme tous les ans, le dernier week-end de janvier :

Les 28 et 29 janvier 2017 !



Pinson des arbres © Y. Février

Contact

En Côtes-d'Armor : GEOCA, 10 Bd. Sévigné – 22 000 Saint-Brieuc

02 96 60 83 75 – bougezpourlanature@orange.fr – geoca.fr

Pour les autres départements : Bretagne-Vivante, Réserve Naturelle de Séné – Brouël Kerbihan- 56 860 – 02 97 66 92 76 - oiseauxdesjardins@bretagne-vivante.org –

bretagne-vivante.org

Pour les plus assidus : comptage hebdomadaire possible toute l'année dans votre jardin et ce, dans toute la France : oiseauxdesjardins.fr

Remerciements

Le GEOCA tient à remercier tous les participants au comptage pour leurs observations, leurs commentaires et leurs photos ! Un grand merci aux journalistes et bénévoles ayant relayé l'information au niveau local. Merci aux responsables et salariés de Bretagne-Vivante avec qui nous avons pu mettre en place une opération régionale exemplaire.

Pour information

Tous les bilans départementaux et régionaux sont disponibles sur les sites internet relayant l'opération :

- le site du GEOCA- **geoca.fr** pour les Côtes-d'Armor
- le site de Bretagne Vivante- **bretagne-vivante.org** pour les autres départements

Dessins de S. Leparoux, d'après un document du GEOCA.

Soutenu par
les primes

